مرحله ی درمان نگهدارنده:رژیم دارویی و مقادیر داروها

گروه مناسب را علامت بزنید؛ سپس مصرف روزانهٔ هر داروی مصرفی را بر حسب **میلی گرم** در خانه های مربوط به نوع دارو ثبت کنید.

گروه ۱☐ گروه۲☐

موارد جدید (اعم از اسمیر مثبت،منفی و خارج ریوی)

R	H

درمان مجدد

E	R	H

پس از مصرف دارو ها خانه ی مناسب را علامت بزنید(علامت* برای مصرف با نظارت مستقیم،علامت - برای مصرف بدون نظارت مستقیم و خانه ی بدون علامت برای مصرف نکردن دارو):

ماه / روز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱

اتا مبوتول=E استرپتومایسین=S پیرازینامید=Z ریفامپین =R ایزونیازید=H

ملاحظه ها:

پاسخ رادیوگرافی: ۱.در ابتدای درمان☐:.....

۲.در انتهای درمان☐:.....

نتیجه بررسی موارد تماس زیر ٦ سال: .....

تعداد کودکان زیر ٦ سال در تماس نزدیک:☐☐

اسامی کودکان زیر ٦ سال تحت درمان ضد سل:.....

.....

اسامی کودکان زیر ٦ سال تحت درمان پیشگیری:.....

.....

تعداد موارد تماس بالای ٦ سال و نتیجه بررسی آنها : .....

نتیجه ی بافت شناسی: .....

تاریخ قطع درمان: / / ۱۳ **علت قطع درمان:**.....

سایر توضیحات:.....

نتیجه درمان	
۱.بهبود یافته(با خلط منفی)	☐
۲.تکمیل دوره درمان(بدون آزمایش خلط)	☐
۳.غیبت	☐
٤.فوت شده	☐
٥.شکست درمان	☐
٦.انتقال یافته	☐
۷.اگر انتقال یافته است نتیجه نهایی ذکر شود:.....	